

South Loop Endoscopy

DAVID C. CHUA, M.D. NAYAR RAJEEV, M.D. ALBERT SAPORTA M.D.

Nulytely

腸鏡日期: _____ 時間: 到達時間會在檢查前一天專人致電通知

檢查前五天: 睡覺前服用三匙 **milk of magnesium**

檢查前三天:
減少食量至平常一半以幫助清腸。

檢查前一天:
全天只能喝(飲)清湯(不含油份,不可有任何固體食物)或水。黃色或無色的碳酸飲料(汽水)/運動飲料/果汁(不含果肉)/果凍(啫喱)。
請不要食用任何奶類製品(牛奶,奶酪,酸奶),紅色,藍色,或紫色果凍(啫喱)。不可以喝粥。可繼續喝(飲)湯或水直至檢查前5小時。

Nulytely: 中午12時開始服用1/2加侖,每15分鐘喝(飲)8盎司,可以和其他液體或果汁一起服用。晚上8時開始服用餘下1/2加侖,每15分鐘喝(飲)8盎司。

Dulcolax 樂可舒通便丸: 下午6時服用全部4顆,然後飲2-3杯水或湯水。

Magnesium Citrate 檸檬酸鎂: 檢查前一天晚上10時服用整瓶,然後飲用2-3杯水或湯水。

重要提醒:
在檢查前5小時不能喝(飲)任何液體。
檢查後需要朋友或親人接送,不能自己乘坐公共交通工具或自己駕車離開。
糖尿病患者: 如有服用口服降血糖藥物,在檢查前一天暫停服用。如需注射胰島素,在檢查前一天將早上劑量減半,並停止晚上劑量。

藥物指引: 請暫停以下藥物

檢查前五天: **Coumadin** (Warfarin 華法林抗凝血劑), **Plavix** (Clopidogrel 保栓通)

檢查前三天: **Advil**, **Motrin** (Ibuprofen 布洛芬), **Ketoprofen** (酮洛芬), **Aleve** (Naproxen 萘普生) 和其他 **NSAIDs** (non-steroidal anti-inflammatory drugs 止痛及消炎藥)

如沒有特別指引,可正常服用藥物

如有任何問題,請致電中文熱線: 630-730-6821 查詢。