

South Loop Endoscopy

DAVID C. CHUA, M.D. NAYAR RAJEEV, M.D. ALBERT SAPORTA M.D.

Plenvu

腸鏡日期: _____ 時間: 到達時間會在檢查前一天專人致電通知

檢查前三天:
減少食量至平常一半以幫助清腸。

檢查前一天:
全天只能喝(飲)清湯(不含油份,不可有任何固體食物)或水。黃色或無色的碳酸飲料(汽水)/運動飲料/果汁(不含果肉)/果凍(啫喱)。
請不要食用任何奶類製品(牛奶, 奶酪, 酸奶), 紅色, 藍色, 或紫色果凍(啫喱)。不可以喝粥。可繼續喝(飲)湯或水直至檢查前 5 小時。

Plenvu:

第一劑: 檢查前一天下午 5 時開始, 步驟如下

- 1: 在杯子裡倒入 dose 1.
- 2: 加入溫水至杯子最高刻度, 然後攪拌
- 3: 將整杯藥液分成 4 份, 每 15 分鐘喝一份, 直至飲完所有藥液, 然後在一小時內喝(飲)兩杯 16 盎司清水。

第二劑: 檢查前一天晚上 8 時開始, 在杯子裡倒入 dose 2 A 和 , 重複步驟二至三。

Dulcolax 樂可舒通便丸: 下午 6 時服用全部 4 顆, 然後飲 2-3 杯水或湯水。

Magnesium Citrate 檸檬酸鎂: 檢查前一天晚上 10 時服用整瓶, 然後飲用 2-3 杯水或湯水。

重要提醒:

在檢查前 5 小時不能喝(飲)任何液體。

檢查後需要朋友或親人接送, 不能自己乘坐公共交通工具或自己駕車離開。

糖尿病患者: 如有服用口服降血糖藥物, 在檢查前一天暫停服用。如需注射胰島素, 在檢查前一天將早上劑量減半, 並停止晚上劑量。

藥物指引: 請暫停以下藥物

檢查前五天: Coumadin (Warfarin 華法林抗凝血劑), Plavix (Clopidogrel 保栓通)

檢查前三天: Advil, Motrin (Ibuprofen 布洛芬), Ketoprofen (酮洛芬), Aleve (Naproxen 萘普生) 和其他 NSAIDs (non-steroidal anti-inflammatory drugs 止痛及消炎藥)

如沒有特別指引, 可正常服用藥物

如有任何問題, 請致電中文熱線: 630-730-6821 查詢。